

# Hospitalizaciones evitables, magnitud en el Hospital de Purranque durante los años 2009-2020

**Antrio Molina V.**

Trabajo corresponde a la actividad de graduación del Magister en Salud Pública y Planificación Sanitaria, Universidad Mayor, Temuco


## Introducción

Las hospitalizaciones potencialmente evitables, son un conjunto de patologías en la que un primer nivel de atención efectiva y adecuada hubiera evitado su ingreso, por lo tanto, no deberían generar una hospitalización. Las tasas de hospitalizaciones potencialmente evitables, se utilizan para valorar los cuidados que afecten principalmente a pacientes adultos mayores con enfermedades crónicas y/o frágiles.

## Resultados

## Materiales y Métodos

Tasa estandarizada de hospitalizaciones potencialmente evitables durante el periodo 2009-2020



Estudio descriptivo, observacional y de tipo ecológico. Utilizando los egresos hospitalarios codificados según CIE 10 y con los siguientes códigos: I50, J44, J45 y J46 de personas mayores de 15 años durante los años 2009 al 2020, caracterizando según patología, edad y sexo, calculando tasas específicas y estandarizadas por edad con método directo, incorporando intervalos de confianza al 95% según la aproximación de Byer Poisson.

## Conclusión


Las HPE representan aproximadamente el 6% del total de los egresos en el periodo. El 70% del total de HPE corresponde a adultos mayores de 65 años y no existe mayor diferencia según sexo.

Las tasas por hospitalización potencialmente evitable van disminuyendo a través del tiempo y afectan principalmente a adultos mayores, a nivel comunal las tasas totales y separadas por patologías son mayores que las informadas nacionalmente.

Las hospitalizaciones potencialmente evitables cobran relevancia en la salud pública, porque afectan principalmente a adultos mayores frágiles y personas que conviven con enfermedades crónicas, involucrando una alta coordinación entre los diferentes niveles de atención y servicios comunitarios.

Para un mejor desempeño, es necesario validar y oficializar un listado de hospitalizaciones potencialmente evitables adecuado al sistema de salud chileno.

Tasa estandarizada por patología de las hospitalizaciones potencialmente evitables durante el periodo 2009-2020



## Referencias

- Angulo Pueyo E, Ridao Lopez M, Martínez Lizaga N, Seral Rodríguez M, Bernal-Delgado E. Variaciones en la Práctica Médica (VPM) Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud - Instituto Investigación Sanitaria Aragón. Atlas de variaciones en la práctica médica en hospitalizaciones potencialmente evitables condiciones que afectan a pacientes crónicos o frágiles en el Sistema Nacional de Salud. ISSN 2017; 4: 1-5
- Bernal E, Beltrán J, Martínez N, Abadía B, Villaverde M. Validez de indicadores de hospitalización evitable en el análisis de la calidad de los cuidados de atención primaria. Atlas VPM; DT01-2008
- Gérvás J, Caminal J. Las hospitalizaciones por ambulatory care sensitive conditions (ACSC) desde el punto de vista del médico de atención primaria. *Rev Esp Salud Publica*. 2007; (1):7-13.
- Martínez-Lizaga N, Montes Y, Rodrigo I, Abadía-Taira MB, Ibañez-Beroiz B, Librero-López L, Bernal-Delgado E y Grupo VPM-SNS. Metodología del atlas de variaciones en hospitalizaciones potencialmente evitables en el sistema Nacional de salud. Atlas VPM, 2011; 4(2): 371-378.