



Desigualdad Social en Salud y Sindemia COVID-19 Región del Biobío 2021 – 2022

Espinoza Martínez, S.^{1,2} y Barrera Sandoval, I.^{1,2}

¹Sociólogo(a).

²Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles, Unidad de Epidemiología, Salud Pública, SEREMI de Salud Región del Biobío.

Introducción

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud “las más poderosas de estas causas (de la enfermedad) son las condiciones sociales en las cuales las personas viven y trabajan”, es decir, los Determinantes Sociales de la Salud. La evidencia muestra que “la mayor parte de la carga global de enfermedad y las inequidades en salud son causadas por los determinantes sociales de la salud”.

Bajo este contexto, la sindemia del COVID-19 tuvo repercusiones para los países debido a su alta transmisibilidad y negativas consecuencias para la salud de la población. Es esencial contar con información oportuna y pertinente para la toma de decisiones que contribuyan a abordar esta sindemia, incorporando el análisis del contexto de desigualdad social y los efectos en el estado de salud de la población.




Materiales y Métodos

Estudio ecológico, de alcance analítico-descriptivo y carácter cuantitativo; en las 33 comunas de la Región del Biobío.

- **Objetivo:** Analizar las brechas de desigualdad social en salud producidas entre comunas de la Región del Biobío en el año 2021 – 2022, en función de indicadores socioeconómicos y de salud, relacionados a la sindemia de COVID-19.
- **Fuentes de Información:** Encuestas poblacionales y registros institucionales, con indicadores de las 33 comunas de la Región del Biobío.
- **Análisis:** Método de monitoreo de las Desigualdades en Salud (OPS, 2016). Análisis de brechas absolutas, relativas, índices de desigualdad de la pendiente (IDP) y de concentración en salud (ICS).

Resultados

- La tasa de incidencia por COVID-19 es mayor en las comunas con menor porcentaje de pobreza por ingresos, mayor escolaridad media y porcentaje de hacinamiento en hogares.
- La tasa de egresos hospitalarios por COVID-19 es mayor en las comunas con mayor porcentaje de pobreza, menor escolaridad media y menor porcentaje de personas en condición de actividad ocupadas.
- La tasa de defunciones por COVID-19 es mayor en las comunas con mayor porcentaje de pobreza, menor escolaridad media y menor porcentaje de personas ocupadas.
- La tasa de años de vida potencialmente perdidos (AVPP) por COVID-19 es mayor en las comunas con mayor porcentaje de pobreza, menor escolaridad media, menor porcentaje de personas ocupadas, y mayor porcentaje de pueblos originarios.



- **Estratificadores Sociales:** Pobreza por ingresos, escolaridad media, hacinamiento en hogares, ruralidad, condición de actividad ocupadas, pueblos originarios.
- **Indicadores de Salud:** Tasa de incidencia, tasa de contactos estrechos, tasa de egresos hospitalarios, tasa de defunciones, tasa de AVPP, brotes laborales, casos asociados a brotes laborales.

Conclusión

Para algunos estratificadores sociales la ventaja social se relaciona con una mayor tasa de incidencia, mayor tasa de contactos estrechos, mayor porcentaje de brotes laborales y casos asociados a brotes laborales. Esto indica que el flujo de personas, en espacios laborales y familiares, y en contextos urbanos con mayor empleo, propician la transmisión del virus.

En aquellas comunas con mayor desventaja social, observamos peores resultados en egresos hospitalarios, defunciones y AVPP, indicadores que se relacionan con la severidad de la enfermedad.

Desde el concepto de sindemia, los resultados refuerzan el análisis respecto a las condiciones desiguales con las que la población llega a enfrentar la pandemia del COVID-19.

Políticas públicas que consideren los determinantes sociales de la salud, con enfoque territorial, intersectorial y de participación, son primordiales para reducir el impacto de las desigualdades sociales en la salud de la población.

Referencias

Organización Panamericana de la Salud (2016). Manual para el Monitoreo de las Desigualdades en Salud, con especial énfasis en países de ingresos medianos y bajos. Washington, D.C.: OPS, 2016.
SEREMI de Salud Región del Biobío (2018). Perfil Regional de Desigualdad en Salud Infantil, Materna y Adolescente. Región del Biobío.

Contacto: sebastian.espinoza.m@redsalud.gob.cl/Isabel.barrera@redsalud.gob.cl