



Antecedentes de la Realización del Test de VIH: Análisis a partir de la X Encuesta Nacional de la Juventud

Olivera del Río, M. P.¹, Salinas-Oñate, N.¹ & De la Hoz Vásquez, S.²

1. Doctorado en Psicología, Universidad de La Frontera.
2. Departamento de Procesos Diagnóstico y Evaluación, Universidad Católica de Temuco.

Introducción

A pesar de los diversos esfuerzos (MINSAL, 2021) en materia de promoción y prevención del contagio del VIH, las cifras de jóvenes que se han realizado el test de VIH continúan siendo bajas (37% para el año 2022; INJUV, 2022). Por ello, surge la necesidad de indagar en los predictores de la conducta de testeo en este grupo de la población, prestando especial atención a los determinantes sociales de la salud (DSS; MINSAL, 2021). Diversas investigaciones a nivel mundial han indagado en los DSS y antecedentes sociodemográficos de la conducta de testeo del VIH (p. ej., Cianelli & Villegas, 2016). No obstante, existe escasa evidencia reciente en Chile (p. ej., Huneeus et al., 2014). El presente estudio se propuso determinar la relación entre antecedentes sociodemográficos, sociales, psicológicos y culturales de la realización del test de VIH.

Material y métodos

- **Diseño:** Estudio transversal con datos secundarios de la X Encuesta Nacional de la Juventud (INJUV, 2022).
- **Muestra:** 8898 jóvenes de nacionalidad chilena entre los 15 y 29 años ($M = 22.48$; $DE = 0,07$), residentes en todo el territorio nacional (50.75% hombres; 59.22% NSE medio).
- **Medidas:** Las variables fueron extraídas directamente de la ENJ.
- **Variable dependiente:** *Realización del test de VIH alguna vez en la vida*, a través de la pregunta “¿Te has realizado alguna vez en la vida el test de VIH?”.
- **Variables independientes:**
 - **Antecedentes sociodemográficos y determinantes sociales:** edad, sexo, situación de pareja actual, nivel socioeconómico, procedencia, identificación con una religión y con una etnia.
 - **Variables asociadas a la salud sexual:** uso de condón en la última relación sexual, edad de inicio sexual, número de parejas sexuales en el último año, diagnóstico de alguna ITS alguna vez en la vida, conocimientos sobre el contagio de VIH.
 - **Variables asociadas a la salud mental:** consumo de alcohol y marihuana alguna vez en la vida, sintomatología depresiva, satisfacción con la vida.
 - **Roles tradicionales de género.**
- **Análisis:** Modelos de regresión logística binomial múltiple, a través de estimaciones de datos basadas en encuestas para diseños de estudios complejos.

Conclusión

Se pudo observar que las personas de mayor edad, las mujeres, quienes tienen pareja, han tenido un mayor número de parejas sexuales, han tenido un diagnóstico de alguna ITS y tienen más conocimientos sobre el contagio del VIH tienen más probabilidades de haberse hecho un test de VIH alguna vez en la vida. En conjunto, las diferencias observadas podrían reflejar un descenso en la percepción de riesgo en determinados grupos de la población (p. ej., personas más jóvenes). Por tanto, se hace necesario indagar en las creencias socialmente compartidas asociadas a la realización del test y procesos psicológicos que pudieran mediar la relación entre los antecedentes estructurales y la conducta en salud.

Referencias

- Cianelli, R. & Villegas, N. (2016). Social determinants of health for HIV among Hispanic women. *Hispanic Health Care International*, 14(1), 4-9. <https://doi.org/10.1177/1540415316629672>
- Huneeus, A., Dearthoff, J., Lahiff, M., & Guendelman, S. (2014). Type of primary education is associated with condom use at sexual debut among Chilean adolescents. *Sexual Transmitted Diseases*, 41(5), 306-311. <https://doi.org/10.1097/OLQ.0000000000000122>
- Instituto Nacional de la Juventud [INJUV] (2022). *10ma Encuesta Nacional de Juventudes 2022*. https://extranet.injuv.gob.cl/documentos_gestor_recursos/uploads/formatos/1c563ae615a8a29d7cb90df9bf9bec15.pdf
- Ministerio de Salud [MINSAL] (2021). *Plan Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA y las ITS, para el periodo 2021-2022*. <https://dijprece.minsal.cl/wp-content/uploads/2022/03/RES-EXENTA-N%C2%B0-1111-Plan-nacional-VIH-SIDA-e-ITS-2021-2022.pdf>

Resultados

Variables	OR (95% IC)
Edad	1.17 (1.14 – 1.20)*
Sexo (ref.: Hombre)	
Mujer	2.32 (1.87 – 2.87)*
Orientación sexual (ref.: Heterosexual)	
No heterosexual	1.03 (0.77 – 1.38)
Situación de pareja (ref.: Solo/a)	
En pareja	1.54 (1.24 – 1.91)*
NSE (ref.: Bajo)	
Medio	0.99 (0.80 – 1.24)
Alto	1.01 (0.63 – 1.61)
Procedencia (ref.: Urbano)	
Rural	0.84 (0.61 – 1.14)
Identificación con una religión (ref.: No)	1.05 (0.85 – 1.31)
Identificación con una etnia (ref.: No)	0.90 (0.66 – 1.23)
Previsión de salud (ref.: Ninguna)	
FONASA	0.85 (0.49 – 1.48)
ISAPRE	0.90 (0.48 – 1.68)
Otra	1.24 (0.51 – 2.99)
Uso de condón (ref.: No)	0.90 (0.73 – 1.12)
N° parejas sexuales	1.06 (1.02 – 1.11)*
Diagnóstico previo de ITS (ref.: No)	3.43 (1.94 – 6.06)*
Conocimiento VIH	1.12 (1.05 – 1.20)*
Consumo de alcohol (ref.: No)	1.04 (0.81 – 1.34)
Consumo de marihuana (ref.: No)	1.20 (0.95 – 1.51)
Sintomatología depresiva	1.10 (0.96 – 1.26)
Satisfacción con la vida	0.95 (0.80 – 1.12)
Roles tradicionales de género	0.97 (0.83 – 1.14)
$F(21, 4703) = 13.92; p < 0.001; \text{Pseudo-R}^2 = 0.205$	

Autor de correspondencia:

Mauro Olivera del Río, estudiante programa Doctorado en Psicología, Universidad de La Frontera, email: m.olivera01@ufromail.cl